

ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଦଳୀ ଗୁଣ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାଳାରେ କଦଳୀ ଚକ୍ଷ

ଡଃ. ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

ଶ୍ରୀମତୀ ଜର୍ବିତା ସେଠୀ

ଡଃ. ଅଜୟ ପ୍ରସାଦ କାନୁନ୍‌ଗୋ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନୁଗୋଳ

ଭାରତରେ କଦଳୀ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୩.୨ ନିୟୁତ ଟନ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ କେବଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ୯୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏହା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଉତ୍ତମ କଷ୍ଟା ଓ ପାଚିଲା ଭାବରେ ଖିଆଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଆକାରର ପାଚିଲା କଦଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଥିବାର ଜଣାଯାଏ । କଦଳୀର ପତ୍ର ବାସନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମଞ୍ଜା ଏବଂ ଉଷ୍ଣାକୁ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ କରି ଖିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାଛଡା ଫଳରୁ ଜାମ୍, ବିସ୍କୁଟ, ଚିପ୍ସ, ମଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥ ଓ ପଚୁକାରୁ ତରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଦଉଡି, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନା ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୯୮୦ ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ୨୮୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜମିଯାଇ ମାତ୍ର ୧୨୦୦୦ ହେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାଳାରେ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାରର ଅଭାବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।

ପ୍ରକାର ଭେଦ :

କଦଳୀକୁ ୨ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ତରକାରୀ କଦଳୀ - ବଡ଼ଳ (ମେଣ୍ଡି ବଡ଼ଳ, ପାଉଁଶିଆ ବଡ଼ଳ) ଓ ବଡ଼ିଶା ଶଙ୍କରା ।
ପାଚିଲା କଦଳୀ - ଚମ୍ପା (ଚିନି ଚମ୍ପା, ନାଲି ଚମ୍ପା) ପାଟକପୁରୀ, କାବୁଲି, ଭୂଷାବାଲା ଶଙ୍କର କିସମ - ସିଓ ୧, ଏଚ ୧, ଏଚ ୨, ଏଫ ଏଚ ଆଇ ୧ ଏବଂ ୩

ମୂଢ଼ିକା ଓ ଜଳବାୟୁ :

ଯେ କୌଣସି ମାଟିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉର୍ବର ବାଲିଆ ଦୋରସା ବା ଗଭୀର ପତ୍ତୁଥିବା ମାଟି ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏହାର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଗଭୀରକୁ ଯାଇନଥିବାରୁ କ୍ଷେତରେ ବେଶାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହିଲେ

ଏହା ସହିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗାହୋଇଯାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁବ ଅନୁକୂଳ କେବଳ ଶୀତଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୧୦° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରୁ କମ ଓ ଖରାଦିନ ଉତ୍ତାପ ୩୫° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ତେବେ ଅମ୍ଳତା ୬.୫ରୁ ୭.୫ ଥିବା ମାଟିରେ ଏହା ଭଲ ହୁଏ । ଏହା ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର କରିଥାଏ ଓ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ମି.ମି. ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବଂଶ ବିସ୍ତାର :

ପ୍ରସ୍ତ ଓ ନିରୋଗ ମା ଗଛରୁ କେବଳ ୫୦୦ରୁ ୭୫୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଙ୍ଖାପୁଆ/ଖଣ୍ଡାପୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନ୍ୟଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ । ଖଣ୍ଡା ପୁଆର ମୂଳଟି ମୋଟା ଓ ଅଗଟି ସରୁ । ପୁଆ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଆଖିରେ ପତୁଥିବା ପାଣି ପୁଆକୁ ନଷ୍ଟକରିଦେବା ଉଚିତ । କାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାଷପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ନୁହେଁ । ପେଷା ପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଦଳୀ ପୁଆ ଅତି ଭଲ । ବୁଜା ପୁଆର କାନ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ପଡେ ଓ ଆକାର ଛୋଟଥାଏ । ପୁଆ ଛୋଟ ହେଲେ କାନ୍ଦି ତେରିରେ ଆସେ ଓ ପୁଆ ଶୁଖି ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

ଚାରା ରୋପଣ :

ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ତେଜା କଦଳୀ ମୃତ୍ୟୁତଃ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ ମାସରେ ଲଗାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ସମୟକୁ ଛାଡି ବର୍ଷର ଅନ୍ୟସମୟରେ ଏହା ଲଗାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଦରକୁ ଦେଖି ଲଗାଇବାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ । ବାମନ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲଭାବରେ ୨/୩ ଓଡ଼ ଚାଷକରି ଘାସବାଛି ମଧ୍ୟମ/ତେଜା ଗଛକୁ ୭ ଫୁଟ ଓ ବାମନ ଗଛପାଇଁ ୫ ଫୁଟ ଦୂରତ୍ବରେ ଦେକ୍‌ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଗଭୀରର ଗାତ ଖୋଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖତ ଓ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ବିଶୋଧିତ ପୁଆକୁ ଲଗାଯାଏ ।

ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ :

କଦଳୀ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଦା, ହଳଦୀ, ବିନ, ବାଦାମ ବା ମୁଗ ଏବଂ ବିରି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ । ସେହିଭଳି ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ ବା ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣ ସମୟରେ ଗଛର ପ୍ରାଥମିକ ବୃଦ୍ଧି କମ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ତିନିବର୍ଷ

ଅନ୍ତଃଫସଲ ହିସାବରେ କଦଳୀକୁ ହିଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଖତସାର :

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କଦଳୀରେ ଖତ ବା ସାର (ଗ୍ରାମ୍/ଗଛ ପ୍ରତି) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସମୟ	ବାମନ/ମଧ୍ୟମ କିଷମ			ତେଙ୍ଗା କିଷମ		
	ଯୁରିଆ	ଫସଫେଟ୍	ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍	ଯୁରିଆ	ଫସଫେଟ୍	ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍
୨ ମାସ	୧୧୦	୩୦୦	୧୩୦	୧୧୦	୩୦୦	୧୩୦
୩ ମାସ	୧୧୦	-	୧୩୦	୧୧୦	-	୧୩୦
୪ ମାସ	୧୧୦	-	୨୬୦	-	-	-
୫ ମାସ	-	-	-	୧୧୦	-	୧୩୦
୬ ମାସ	୧୧୦	-	-	୧୧୦	-	୧୩୦

ତେବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଥିବା ବଗିଚାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜୈବସାର (biofertiliser), ଅଣୁସାର (micronutrient) ବା ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାନ୍ଥର ଆକାର ବଢ଼ାଇହୁଏ । ଗଛରେ ଅଣୁସାରର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ ସଲଫେଟ୍ (୧୨.୫ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର) ବୋରାକ୍ସ (୨ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର) କିମ୍ବା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ (୧୫ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଗଛ ୩ରୁ ୪ ମାସର ହେଲେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ ଓ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଆରବିକୁଲାର ମାଇକୋରାଇଜା କୋଡ଼ାଖୁସା ସମୟରେ ମୂଳରେ ଦେଲେ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ।

ପରବର୍ତ୍ତି ଯତ୍ନ :

ପ୍ରତି ମାସରେ ସାର ଦେଲାବେଳେ ଘାସ ବାଛି କୋଡ଼ା ଖୁସା କରି ଶୀତ ଓ ଖରା ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମୂଳରୁ ମାଟି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ୨ ଧାତି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ନାଳା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଳି ପାଣି ଗତିଯିବ । ବଗିଚାରେ ପାଣିପୁଆ ଦେଖାଦେଲେ ତାକୁ ଉପାତି ତା ଜାଗାରେ ଶିଙ୍ଗିପୁଆ ଲଗାନ୍ତୁ । ଗଛ ବଢ଼ିବା ସହ

ମୂଳରୁ ପୁଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ । ତେବେ କାନ୍ଧି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପୁଆକୁ କାଟି ତା ଜାଗାରେ କିଛି (୪ ମିଲି) କିରୋସିନି ଢାଳି ମୂଳରୁ ପୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ସବୁ ପୁଆକୁ ବଢିବାକୁ ଛାଡି ଦେଲେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଛୋଟ ଓ ଦାନା ସବୁ ହୋଇଯାଏ । ମୂଳି ଫସଲରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା କାନ୍ଧି ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ଗଛପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଆ ବଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ମା ଗଛ କାଟିବା ସମୟରେ ପୁଆର ଅଗ କାଟି ଦେଲେ କନ୍ଦଟି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଛରେ ସାର ଦେବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଓ ରୋଗା ପତ୍ର, ବାହୁଳୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କାଟି ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଅଧିକ ପବନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ କାନ୍ଧି ନଆସିବ, ସେହିଭଳି ଲଗାଇବା ସମୟ ଠିକ କରନ୍ତୁ । ଦରକାର ପଡିଲେ ଗଛରେ ଭିରା ଦିଅନ୍ତୁ । କାନ୍ଧି ଆସିବା ପରେ ୧୫-୨୦ ସେ.ମି. ଛାଡି ଭଣ୍ଡାଟିକୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ । କାନ୍ଧିରେ କଣାଥିବା ପଲିଥିନ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ପାକଳ ହୁଏ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ ।

ଜଳସେଚନ :

କଦଳୀ କିଆରୀରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଗଛ ରୋଗିଣୀ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମାଟି ଶୁଖିଲା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ବତର ଦେଖି ୭ରୁ ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । କେନାଲ ପାଣିରେ ଜଳସେଚନ ନକରି ପାଚଳକୂପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ କଲେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଥାଏ ।

ରୋଗ ଓ ପୋକ :

କଦଳୀ ଗଛରେ ଅଧିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଓ ପତ୍ର ଚଉଡ଼ା ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫିଙ୍ଗି ବୀଜାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା ।

ଫିଙ୍ଗି ଜନିତ ରୋଗ

୧) **ସିନାଟୋଜା ପତ୍ରଦାଗ** - ଏହା କାବୁଲୀ ଜାତୀୟ କଦଳୀରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ । ପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଓ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇ ଆଖୁଭଳି ଦିଶେ ଓ ଚାରିପଟେ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ପରେ ପୁରା ପତ୍ର ହଳଦୀଆ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ତଳପତ୍ର ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ଅଗପତ୍ର ଆଡକୁ ମାଡିଥାଏ । ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ମରିଯାଏ ।

୨) **ପାନାମା ଝାଞ୍ଜିଲା ରୋଗ** - ଏହି ରୋଗ ବଡ଼ଳ ଓ ପାଚକପୁରା ଜାତୀୟ

କଦଳୀରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ । କାନ୍ଥ ଆସିବା ସମୟରେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ଝାଉଁଳି ଗଛରୁ ଓହଳି ପଡେ । ବେଳେବେଳେ ମୂଳଫାଟି ସେଥିରେ ଛୋଟ କାନ୍ଥ ବାହାରେ । ଗଛ କାଟିଲେ ଭିତରୁ ସଜାପାଣି ବାହାରେ ଓ ଗନ୍ଧ ହୁଏ ।

୩) ଆମ୍ବୁକନୋଇ - ପତ୍ର ଓ ଫଳରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ ।

୪) ମୂଳ ସଜା ରୋଗ - ଗଛର କାନ୍ଥ ପଟିଯାଏ ଏବଂ ଚେର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ । ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପତ୍ର ଝୁଲି ପଡେ ।

୫) ବାଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା - ପତ୍ରଧାରରୁ ପୋତିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ପୁରାପତ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତିଗଲା ଭଳି ଦିଶେ । ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ମରିଯାଏ । ପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡେ । ଫଳ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ।

୬) ସୁତକୃମି - ଚିନି ପ୍ରକାରର ସୁତକୃମି କଦଳୀ ଗଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଚେରକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ପତ୍ର ଦଳଦିଆ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ । ଖାଦ୍ୟ ଚେର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

ପୋକ

୧) କାଣ୍ଡବିନ୍ଧକ ଯୁଣି ପୋକ - କଳାରଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଆ ଅଟନ୍ତି, ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଧଳା, ମାଂସଳ, ମୁଣ୍ଡଟି ଲାଲ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ ନଥାଏ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ କାଣ୍ଡଟିକୁ କଣା କରି ଭିତରୁ ଖାଇଦେବା ଦ୍ଵାରା ଆଗପତ୍ର ମରିଯାଏ । ପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଏ । ମା ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ କଣା କରି ଭିତରେ ଖାଇ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାଆନ୍ତି ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି କଣା ପାକରୁ ଭାଙ୍ଗିପଡେ ।

୨) ମୂଳ ବିନ୍ଧକ ଯୁଣି ପୋକ - ଏହାର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳରେ ଥିବା କନ୍ଦକୁ କଣା କରି ରସ ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଓ କନ୍ଦା ପଟିଯାଏ ।

୩) ଜଉଆ ପୋକ - ପତ୍ର ତଳେ ରହି ରସଶୋଷନ୍ତି, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା ହୋଇଯାଏ ଓ ଏହା ମାତାଭୁକ ଭୂତାଣୁ ରୋଗ ଅଣକଦଳୀଆର ବାହକ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ ।

ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ

ଏହି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ କେବଳ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଵରୂପ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ କିଆରୀରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଉପାଦି ଦୂରରେ ନଷ୍ଟକରି ଦେବାକୁ ହେବ ।

୧) ଅଣକଦଳୀଆ - ଗଛର ଅଗପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳପତ୍ରଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ପରି ଜଣାଯାଏ । ଗଛରେ କାନ୍ଥ ଆସେ ନାହିଁ । ପତ୍ରକୁ ଧରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ଏହି ଭୂତାଣୁ କଦଳୀରେ ଲାଗୁଥିବା ଜଉପୋକ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପେ ।

୨) ପତ୍ର ସାହେବୀ - ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ଗାର ଦେଖାଦିଏ ଓ ପରେ ବଡ଼ବଡ଼ ଦଳଦିଆ ଦାଗର ଛାପ ଦେଖାଯାଏ । ବାହାର ପତ୍ରର ଆବରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡେ । ଗଛରେ ଛୋଟ କାନ୍ଧି ପଡେ ଓ ଫଳର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଜଉଆ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

୩) ଇଣ୍ଡା ସାହେବୀ - ଇଣ୍ଡା ଉପରର ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲକ୍ଷତ୍ ବାଦାମୀ ହୋଇଯାଏ । ଜଉଆ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । କଦଳୀ ଦାନାର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ।

ସମନ୍ୱୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା

- ୧) ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ପୁଆ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବରିଚାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂତାଶୁ ରୋଗ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ।
- ୨) ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳିବାପରେ ତାକୁ ୮ ଦିନ ଖରାଖୁଆନ୍ତୁ । ପରେ ଅଳିଆ ଦେଇ ପ୍ରତି ଗାତରେ ଧୂଆଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରାକି ଭଲ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ମାଟି ସଂସର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିମ୍ପି ଜନିତ ରୋଗ କମିଯିବ ।
- ୩) ପୁଆ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାତରେ ଖତ, ମୂଳସାର ଦେଇ ପ୍ରତି ଗାତରେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ବା କରଞ୍ଜ ପିଡିଆ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଫ୍ୟୁରାଡ଼ନ ଦାନାଦାର ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ସୁତକୃମି, କଦମ୍ବର ଓ ଭଲକର ଆକ୍ରମଣକୁ କମାଇବ ।
- ୪) ପୁଆ ବିଶୋଧକ - ମୂଳ ଗଛରୁ ପୁଆଗାତି ଗୋଟିଏ ଅନୁରା ଦାରେ ତାର ମୂଳର ସବୁ ତେର ଓ ମାଟି ଛତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଅଗ୍ରକାଣ୍ଡଟି କାଟି ମାଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଏହି ପୁଆକୁ ୨ ଦିନ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସୌର ତାପ ବିଶୋଧନ କୁହାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ୫ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ ଲମ୍ବା ଏବଂ ୧ଫୁଟ ଗଭୀର ଗାତ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ପଲିଥିନ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ୧୦ ବାଲଟି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ବାଲଟି ପାଣି ପିଛା ୫ କି.ଗ୍ରା କଞ୍ଚା ଗୋବର, ୨୦ମି.ଲି. ମନୋକ୍ସିଡ଼ୋଫସ ଫସଫେଟ, ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ବାରିଷିନ୍ ଓ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ତେପଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉତର ହିସାବରେ ୧୦ ବାଲଟି ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ତାପରେ ସେଥିରେ ଥରକୁ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ଟି ମାଣ ବୁଡ଼ାଇ ୨୦ ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପୁଣି ବାହାର କରି ଛାଇରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖି ଗାତରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଗଛ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଓ ପୋକକୁ ଦମନ କରିଥାଏ ।

୫) ଗଛ ମାସକର ହେଲେ ପ୍ରଥମ କୋଡାଖୁଆ ସମୟରେ ବିଭିଷ୍ଣନର ଶତକଡ଼ା ୫ ଭାଗ ଦାନାଦାର ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଓ ଫୁଲଗୁଡ଼ ଦାନାଦାର ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବା ହୁଡ଼ାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୬) ଗଛ ୪ ମାସର ହେଲେ ପତ୍ରଉପରେ ଥରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପତ୍ରଦାଗ, ବାଜାଣ୍ଡ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ଓ କନ୍ଦସଜା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଭିଷିନ (୧ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣିପ୍ରତି) ବା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ (୫ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣିପ୍ରତି) ମିଶାଇ କିଛି ଅଠା ଯଥା ଧାନୁରିଟ୍, ଆକ୍ରିଭା-୮୦ ବା ଆସ୍ବା ସହ ମିଶାଇ ଓ ପ୍ଲଷ୍ଟୋମାଇସିନ୍ (୧ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି) ସହ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

୭) ବଗିଚାରୁ ନିୟମିତ ମଲା ଓ ରୋଗା ପତ୍ର ଓ ସଜାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭୂତାଣ୍ଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଉପାତି ଦୂରରେ ପୋତିନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

୮) ଗଛ ୬ ମାସର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଥରେ ମନୋକ୍ଲୋଟୋପସ୍ (୨ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣି) ଓ ଡିଥେନ୍ ଏମ୍-୪୫ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି) ଓ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅଠା କିଛି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଜଉଆ, କାଣ୍ଡ ଓ କନ୍ଦ ବିକ୍ଷେପ ଘୁଣି ପୋକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏହା ଦମନ କରିପାରିବ ।

୯) ଫୁଲ ଓ ଉଷ୍ଣ ସମୟରେ ଥରେ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ (୫ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୧୦) ମଝିରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଘୁଣି ପୋକ ଲାଗିଲେ ତାଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କଣାଟି ଠାବ କରି, କଣା ଉପରୁ ୫ସେ.ମି.ରୁ ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜରେ ୫ ମି.ଲି. ମନୋକ୍ଲୋଟୋପସ୍ ଓ ୫ ମି.ଲି. ପାଣି ମିଶାଇ ତାର୍ଯ୍ୟକ ୪୫° କୋଣ କରି ଛୁଞ୍ଚି ପୂରାଇ ଗଛରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୂଳି ଫସଲ

ବଗିଚାରେ ରୋଗ ପୋକ କମ୍‌ଥିଲେ ମା.ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଫସଲ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଫସଲର ୭-୧୦ ମାସରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । କାନ୍ଧି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଓ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପରେ ଗଛକୁ ଅଧାରୁ କାଟି ପରେ କୋଡାଖୁଆ କରି ସାର ଓ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲଗାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମି ଲାଭ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

ଅମଳ

ପୁଲ ଆସିବାର ୧୫୦-୧୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ ଫଳ ଧାରଣର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ବାମନ କଦଳୀ ଲଗାଇବାର ୮ ରୁ ୯ ମାସ ଭିତରେ ଓ ତେଜା କଦଳୀ ୧୧-୧୨ ମାସରେ କାନ୍ଧି ପକାଇଥାଏ । ଖରାଦିନେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଶୀତଦିନେ ତେରିରେ ଫଳ ପାକଳ ହୋଇଥାଏ । କଦଳୀ ଅଗରୁ ପୁଲ ଖସିଲେ ଓ ଚୋପା ଗୋଲ ବୁଲିଗଲେ ଫଳ ପାକଳ ହେଲାବେଳି ଜଣାଯାଏ । ପାଖ ବଜାର ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ସମୟରେ ଓ ଦୂର ବଜାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧିରୁ ଶତକଡ଼ା ୭୫ ଭାଗ ଫଳ ପାକଳ ହେଲେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । କିସମ ଅନୁସାରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦-୬୦ଟନ୍ କଦଳୀ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ପୁଆ ଉତ୍ପାଦନ

ଏହା ଆଜିକାଲି ଏକ ଲାଭ ଜନକ ବ୍ୟାପାର । କଦଳୀର ପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ପତ୍ର ମା କନ୍ୟା ଉପରୁହିଁ ବାହାରିଥାଏ । ତେଣୁ ମା ଗଛକୁ ଲଗାଇବା କରି କମ ଗଭୀରରେ ଲଗାଇ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାତ ଜାତୀୟ ସାର ଦେଲେ ଅଧିକ ପୁଆ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦାର ସାଇଜ ଛୋଟ ହୁଏ । ମା ଗଛରୁ ପତ୍ର କାଟିଲେ ପୁଆ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ ଓ ସେହି ଭଳି ମନ୍ଦିରରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ପୁଆ ଥିବାରୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଗଷ୍ଟ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଟମ୍ବା, ଚିଟିଟମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ଗୁଡ଼ିକୁ ୨.୫ରୁ ୩ ମିଟର ଦୂରତାରେ ଲଗାଯାଇ ପ୍ରତିଗଛରେ ୫ରୁ ୮ଟି ପୁଆ ରଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଫସଲରୁ କଦଳୀ ଓ ମୂଳା ଫସଲରୁ ପତ୍ର କଟାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ।

ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ

ଏହି ଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ୨୬,୭୫୦ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ୧୨,୫୦୦ଟଙ୍କା ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ୧୧,୩୦୦ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ୪୬,୮୦୦ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ୪୧,୬୦୦ଟଙ୍କା ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ୩୬,୪୦୦ଟଙ୍କା ଆୟ ମିଳିଥାଏ ।



ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ

ପୋ : ବୁଦ୍ଧାବିହାର, ପଟ୍ଟନାଗା, ପ୍ରଭୁବନ୍ଧୁ-୭୫୧୧୩୭