

ଫଳଚାଷରେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗଯୋଜ ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନୁଗୁଳ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ଫଳଚାଷରେ ସୁଖ୍ୟ ରୋଗଯୋଜ ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ, କବଳୀ, ଲେମ୍ବୁ ଆଦି ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳ ହିସାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଏହି କମ୍ ଅମଳ ହେବାର କାରଣ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଯୋଜ ଜନିତ ଆକ୍ରମଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ । ଏହି ରୋଗ ଯୋଜ ଜନିତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଶତକଡ଼ା ୩୦ ଭାଗ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ଏହା ୫୦ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଥାଏ । ଆମ, କବଳୀ ଆଦି ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗଯୋଜ ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା :

ଯୋଜ:

୧) **ଆମ ତାହାଣୀ:** ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବଗିଚାରେ ନଭେମ୍ବର ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅଣ୍ଡାଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବରଳ ଓ ଫୁଲର ନରମ ଅଗ ଓ ଛୋଟ କଢି ଆମରୁ ରସ ଶୋଷିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଫୁଲ ଓ କଢି ଝଟିପଡେ । ସେମାନଙ୍କ ମଳତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ସୁଟିଫୋଲ୍ ନାମକ କଳା ରଙ୍ଗର ଫିଙ୍ଗି ବଢି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଛୋଟ ଆକାରର କରିଦିଏ । କାନୁୟାରା ମାସକୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ ଓ ଫଳ ସବୁ ଝଟିପଡେ । ଖରାଦିନ ଆଡ଼କୁ ଏମାନେ ପତ୍ର ଉପରୁ ଚାଲିଆସି ଗଛ ଗଣ୍ଡିମୂଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

କ) ବଗିଚାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥାଏ । ଏଣୁ ଜଳ ସେଚନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଖ) ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନରଖି ୩୦ ଫୁଟ ବା ୨୫ ଫୁଟ ଦୂରତ୍ବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଗ) ବର୍ଷାଦିନ ପରେପରେ ବଗିଚାରୁ ଘାସ ସଫାକରି ଭଲରେ ଦୁଇଓଡ଼ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

ଘ) ଖରାଦିନେ ବଗିଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ ଡାଳକୁ ଏକାଠି କରି ଏହା ଉପରେ କିଛି ମାଟି ରଖି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଙ) ବଗିଚାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ କୀଟନାଶକର ସିଞ୍ଚନକରନ୍ତୁ । ଆମଗଛର ଅଗ ଫୁଲି ବରଳ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଥରେ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (୩ମିଲି/୧୦ଲି. ପାଣି) ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଥରେ ଟ୍ରାଇଆଜୋଫସ୍ (୧ଗ୍ରାମ/ଲି. ପାଣି) ଓ ଆମ ଚଣା କଷି ଗଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (୩ମିଲି./୧୦ଲି ପାଣି)ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୨) **ଦହିଆଯୋଜ ଓ କାଟି ଯୋଜ :** ଏମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫଳ ଚଢ଼େଇରେ ଓ ଫଳ ଉପରେ ରହି ରସ ଶୋଷିନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମିଠା କିସମ ଯଥା ବାଇରଣପଲ୍ଲୀ, ଲାଙ୍ଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ମାଛଯୋଜଗୁଡ଼ିକ ଖରାଦିନ ପରେ ଗଛରୁ ଆସି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଡାଦିଅନ୍ତି ଓ ଅଣ୍ଡାକୁ ପୁଣି ଅଠା ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏମାନେ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ମାସକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ଓ ରସଶୋଷି ନଷ୍ଟକରନ୍ତି । ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଝାଡ଼ାରୁ ନିର୍ଗତ ଶର୍କରା ପଦାର୍ଥରେ ସୁଟିଫୋଲ୍ ହୋଇ ଫସଲର ଅଧିକକ୍ଷତି କରନ୍ତି ।

କାଟିଯୋଜଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଇଷଡ୍ ଲୋହିତ ଏବଂ ଏମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଦହିଆଯୋଜ ପରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ଖାତଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଏମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରୁ ଉଠିଆସି ନରମ ପତ୍ରର ତଳଭାଗ ଓ କଲି ଅଂଶରେ ରହି ରସ ଶୋଷିନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଫଳରେ ଅମଳ ଓ ବଜାର ଦାମ୍ କମିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର : କ) ଖାତଦିନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗଛମୂଳରେ ୧ଫୁଟ ଓସାରର ଆଲକାଥେନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଟା' ଉପରେ ଗ୍ରୀସ୍ ବୋଳିଦିଅନ୍ତୁ । ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଲାଗି ରହିଯିବେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାରନ୍ତୁ ।

ଖ) ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ଅଖାକୁ କିରୋସିନ୍ ମିଶା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଗଛମୂଳକୁ ପ୍ରତି ୧୫ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଖାତ ଦିନରେ ଘସି ଦେଲେ ଛୁଆ ଆଉ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କମିଯାଏ ।

ଗ) କେତେକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭେଦୀ କୀଟନାଶକ ଯଥା ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ବା ଆସିବାମିପ୍ରିଡ୍ (୩ମିଲି/ଲିଟର) ଡିସେମ୍ବର ଓ କାନୁଆରା ମାସରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏମାନଙ୍କ

ଛୁଆକୁ ଦମନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।

ଘ) କ୍ରିପଟୋଲାଇଫସ୍ ମନଟ୍ରୋଜେରୀ ନାମକ ପରଭୋଜୀ କୀଟର ଶଲଭକୁ ପ୍ରତି ଗଛ ୨୦ ଟି ହିସାବରେ ଛାତିଲେ ସେମାନେ ଏହି କୀଟିଯୋକ ଓ ଦହିଆ ଯୋକକୁ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।

୩) ଟାକୁଆ ଖୁଆ ଘୁଣି ଯୋକ : ଶୁଷ୍କ ଥିବା ଜଳାରଙ୍ଗର ଏହି ଘୁଣି ଯୋକମାନେ ଫଳ କସିଥିବା ବେଳେ ବା ତେମ୍ପ ତଳେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଛୁଆ ବାହାରି ଫଳର ମାଂସ ଜଣାକରି ଖାଇ ଟାକୁଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେହିପରି ଖାଇ ପରେ କୋଷାକରନ୍ତି । ଫଳ ପାଟିବା ପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରୁ ଫଳ ଜଣାକରି ବାହାରି ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

(କ) ନିରନ୍ତର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ବଗିଚା ଭିତରେ ପଡିଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳ ସବୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

(ଖ) ଫଳ ଟୋଳି ସାରିବା ପରେ ବଗିଚା ଭଲଭାବରେ ୨ ଓଡ଼ ଟାଏକରିଦେଲେ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ପୁର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସି ମରିଯାଆନ୍ତି।

(ଗ) ଫଳ କସିଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ଥର, ଥରେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (୩ମି.ଲି/ଲିଟର ପ୍ରତି) ଓ ଅନ୍ୟ ଥରେ ଆସିଫେଟ୍ (୧ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପ୍ରତି) ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ।

୪) ଫଳମାଛି : ସାଧାରଣ ମାଛିଠାରୁ ଆକାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଇଷଟ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏହି ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ପାକଳ ଫଳର ତଳେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଫଳର ରସ ଖାଆନ୍ତି । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପଡିଯାଏ ଓ ପୁରା ପାକଳ ହେବା ଆଗରୁ ଖସି ପଡେ । ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ କିଛିଦିନ ପରେ ଫଳରୁ ବାହାରି ଆସି ମାଟିରେ କୋଷା କରନ୍ତି । ସେଥିରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଛି ବାହାରି ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଫଳ ଯଥା କଦଳୀ , କମଳା , ପିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦିରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ବିଳମ୍ବରେ ପାରୁଥିବା ମିଠା କିସମ ଯଥା ଆମ୍ରପଲ୍ଲା , ଦସେରୀ, ମଲୁକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରତିକାର :

(କ) ବର୍ଷାଦିନେ ବଗିଚାକୁ ଦୁଇ ଓଡ଼ ଭଲରେ ଟାଷ କଲେ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା କୋଷା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ମରିଯିବେ ବା ଟାଷ ସହ ମାଟିରେ ଏକତ୍ର ପ୍ରତି ୫ କି.ଗ୍ରା କ୍ୟୁରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ।

(ଖ) ଆକର୍ଷକ ବିଷ ଥୋପର ପ୍ରୟୋଗ : ଗୋଟିଏ ମାଟି ସରାରେ ୫୦ ମିଲି ମାଲୁଥୁଅନ ଦ୍ରବଣ, ୩୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ ବା ଚିନି, ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟ ବଟିକା, ୨୦ ଗ୍ରାମ ମାଛ ଶୁଖୁଆର ଗୁଣ୍ଡକୁ ରଖି କିଛି ପାଣି ସହ ୨ ଦିନ ପଚାଇ ପରେ ବଗିଚାରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏକତ୍ର ପ୍ରତି ୮ରୁ ୧୦ଟି ସରା ଯଥେଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ଫଳ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ ଓ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି କିରୋସିନ୍ ବା କିଛି ବିଷ ମିଶା ପାଣିରେ ପକାଇ ମାରନ୍ତୁ।

:ଆମରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗ:

୧. ପାଣ୍ଡୁରକ ରୋଗ : ବଉଳ ଓ ପତ୍ର ଉପରେ ଧଳା ଧଳା ଦାଗ ହୋଇ ଫୁଲ ଝଟିପଡେ । ଶୀତଦିନେ ବର୍ଷାପାଗ ରହିଲେ ଏହାର ପାରୁର୍ତ୍ତାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ପତ୍ର ଓ ଛୋଟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗଛରୁ ଝଟିପଡେ ଓ ଗଛର ଅମଳ କମିଯାଏ।

ପ୍ରତିକାର : ଗହକ ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ ଗୁଣ୍ଡ ବା ବ୍ରାଉଡିମର୍ଫ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ମି.ଲି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ବାହାଣୀ ଦମନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।

୨. ମାଲଫରମେସନ (ବଉଳା ମୋଟା ରୋଗ) : ଏହି ରୋଗ ଫିଫି ଆକ୍ରମଣ ତଥା ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବଉଳ ମୋଟା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଦିଶେ ଓ ଫୁଲରୁ ଫଳ

ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟଗଛକୁ ଏକଜାତୀୟ ଅଷ୍ଟପତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଦିଶେ ଓ ପରେ ଡାଳର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ ।

ପ୍ରତିକାର :

- କ) ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଉଳ ଓ ଡାଳକୁ ଜାତି ଦୂରରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଖ) ବଉଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ୨ ଗ୍ରାମକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଓ ୭ଦିନ ପରେ ଇମିଡ଼ାକ୍ସପ୍ରିଡ଼ (୩ମି.ଲି/୧୦ଲି. ପାଣି) ସହ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ. ଗ୍ଲାନୋଡ଼ର୍ମା ଚେରସଢ଼ା : ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ଝଡ଼ିପଡ଼େ ଓ ପରେ ଗଛଟି ଶୁଖି ମରିଯାଇଥାଏ । ବର୍ଷାଦିନେ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଛତୁଫୁଟି ଯାଏ । ଏଭଳି ଗଛର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ହାତରେ ଧରିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର :

- କ) ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଓ ଚେର ନଷ୍ଟ କରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଖ) ଚେରକୁ ଡିନୋକ୍ୟାପ୍ ଫିମ୍ପି ନାଶକ ବା ଟ୍ରାଇକୋଡ଼ର୍ମା ଭିରିଡ଼େରେ ବିଶୋଧନ କରି ଚେରକୁ ମାଟିଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ଓ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ସମୟ ଓ ସେ ସମୟର ପରିବେଶ

- ୧. ଆମଡ଼ାହାଣୀ : ଛାଇ ସହ ଜଳବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଅଧିକ ଉଷ୍ମାପ - ଫେବୃୟାରୀ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ।
- ୨. ଦହିଆପୋକ : ନଭେମ୍ବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଜଳବାୟୁ ।
- ୩. ଫଳମାଛି : ମେ ରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମାପ ସହ ଜଳବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳାୟବାଷ ।
- ୪. ପତ୍ରମୋଡ଼ା : ଜୁନ୍ ରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଜଳବାୟୁରେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମାପ ଓ ଜଳବାୟୁ ।
- ୫. ଡାଳପୁଡ଼ା ପୋକ : ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ମଧ୍ୟମ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ।
- ୬. କାଟିପୋକ : ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ।
- ୭. ପାଣ୍ଡୁରକ ପୋକ : ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଜଳବାୟୁରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା
- ୮. ଫଳସଢ଼ା : ଫଳସମୟରେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ୨୫° ସେ ଓ ଜଳବାୟୁରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା

ପୋକଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୋହଳା ସୀମା ନିରୂପଣ :

ବଗିଚାରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଲି ଗଛକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ପୋକଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ଗଛକୁ ଝାଡ଼ି ସିଧା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା, ଗଣ୍ଡି ଦେହରେ ଚକ୍ର ଦାଗ ଦେଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବସୁଥିବା ତାହାଣୀ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ, ୧୦ଟି ବଉଳକୁ ଏକାଠିକରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଫୁଟ କାର୍ଡ ଉପରେ ଝାଡ଼ି ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାହାଣୀ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଏ । ଯଦି ପ୍ରତି ବଉଳ ପିଛା ୫ଟି କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାହାଣୀ ପୋକ ବାହାରେ, ତେବେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର ହୁଏ । ଏହାଛଡ଼ା ପୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଡ ବା କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ ଓ ମାତ୍ରା ଆକଳନ କରି ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ।

କଦଳୀର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗପୋକ

- ୧. କଦଳୀ ଗଛରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ : ସାଧାରଣତଃ ଏ ପୋକ ଅପ୍ରେଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଛକୁ ବେଶି ଆକ୍ରମଣ କରେ । ସତସତିଆ ଯାଗା, ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛଥିବା ବଗିଚା ଓ ଗଛ ମୂଳ ସଫା ହେଉନଥିବା ବଗିଚାରେ ଏ ପୋକର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବେଶି । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବେଶୀ ହୁଏ । ଏ ପୋକ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାରେ ବା କାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବାକୁ ସହଜରେ କୌଣସି କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ପକାଇ ଏହାକୁ ଆୟତ କରାଯାଇ ପାରେ । ଗଛମୂଳରେ ୨୦ ବା ୪୦ ଗ୍ରାମ ଫୁରାଡନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଗଛଟିଏ ପୋକ ପାଇଁ ବିଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ଗଛରେ ପୋକଥିଲେ ମରିଯାଏ ପୁଆ ଲଗାଇବା ବୋଲି ପୁଆକୁ ୦.୧ ଭାଗ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଲଗାଇଲେ (ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ତିନି ମିଲି) ବା ଗଛ ମୂଳରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ କରି ଫୁରାଡନ୍ ଦେଲେ ଏ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ

କରେନି ।

୨. କଦଳୀ ଗଛରେ କଣା କରୁଥିବା ପୋକ : ଏ ପୋକ କଦଳୀ ଗଛରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ସିଧାକରି ନଳାମାନ କରିଥାନ୍ତି । ବେଶା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ହଳଦିଆ ପତେ ଓ ଗଛ ବଢେନି । ସାଧାରଣତଃ ଖରାଦିନେ ଓ ବର୍ଷାଦିନେ ଏ ପୋକ ବେଶି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ମୂଳକୁ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୋଫସ୍ (୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲିଲିଟର) ବା କ୍ଲୋରେଫ୍ଲୁଇରିଫସ (୧ ଲିଟରରେ ୩ ମି.ଲିଟର ସ୍ତେକରନ୍ତୁ)

୩. କଦଳୀର ଜରଆ ପୋକ : ଜରଆ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଓ ମାଟିଆ ବା କଳା ରଙ୍ଗର । ସେମାନେ ଗଛରୁ ଉପଶେଷି ବସନ୍ତି ଓ ଅଣକଦଳିଆ ରୋଗର କାରଣ ଦୁଅନ୍ତି ।

ପ୍ରତିକାର: ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୋଫସ୍ ବା କାର୍ବୋଫ୍ଲୁଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲିଲିଟର) ପକାଇ ଏପୋକକୁ ଆୟତ କରାଯାଏ ।

କଦଳୀର ରୋଗ

୧. କଦଳୀରେ ପାନାମା ଝାଉଁଳା ରୋଗ:- ଏହା ଫିଫି ଜାତୀୟ ରୋଗ । ଫିଫି କଦଳୀ ମୁଣ୍ଡା (ମୂଳ) ତଥା ଗଛର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବରୋଧ କରେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ । ଏହା ଫଳରେ ପତ୍ରର ଧାର ହଳଦିଆ ପଡି ଧିରେ ଧିରେ ମଝି ଶିରା ଆଡକୁ ଗତି କରେ କିନ୍ତୁ ମଝି ଶିରାଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରୁହେ । ପରେ ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଗଛର ପତ୍ରସବୁ ଝୁଲିପଡେ, ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଝୁଲି ପଡେ । କାହିଁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଦାଗ ପତ୍ର ଝୁଲିପଡିଥାଏ । ଏହି ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଣ୍ଡିରେ ଫାଟ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରତିକାର ସବୁପ ରୋଗମୁକ୍ତ ପୁଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ପୁଆକୁ ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ୨ ଗ୍ରା/ଲି ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡାଇବା ତଥା ଗଛକୁ ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୬ ମାସ ପରେ ୨ ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ତାଲି ମାଟି ମିଶାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଛଡା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଦଳୀ ନ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକାରୀ କିସମ୍ ଯଥା ରୋବକ୍ସ, ଡ୍ୱାଫ୍ କାରେଣ୍ଡିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ।

୨. କଦଳୀର ପତ୍ର ଦାଗ:- ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ରର ଶିରାରେ ସମାନ୍ତରାଳରେ ଇସଡ୍, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଗାଢ଼ ହେଲେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ର ପୋଡିଯାଏ ତଥା କାହିଁର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ ତଥା ବୁଲଟକୁ ୫୦ କିମ୍ବା ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ୨ ଗ୍ରା ସହିତ ଟିପଲ ୧ ମିଲି /ଲି ପାଣିରେ ୨-୩ ଥର ୧୦-୧୨ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ବେଶା ହୁଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲର ରୋଗ ଓ ପୋକ

୧. ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମୂଲସଡ଼ା ରୋଗ :- ଏହି ରୋଗ ଉତ୍ତମ ଚଳି କିଆରି ତଥା ଜମିରେ ଦେଖାଯାଏ । ମୂଲ ସଡ଼ିବାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଧାରେ ଧାରେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ । ତଳି କିଆରୀରେ ମଞ୍ଜିବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜିକୁ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ ଦ୍ୱାରା ଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଛଡା ଗଛର ମୂଳକୁ ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ୨ ଗ୍ରା/ଲି ତଥା ରିଡୋମିଲ୍ ୩ ଗ୍ରା/ଲି ପାଣିରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ୧୦-୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଭିଜାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ ବା ପଟାଲିକୁ ଗତାଣିଆ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୨. ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମୋଜାଇକ୍ ଭୂତାଣ୍ଡ :- ପତ୍ରରେ ଦାଗ, ଶିରର ବିକୃତ ରୂପ ତଥା ଲୁଣ ପରି ଆକାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ପାଣି ଫୋଟକା ଦାଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ତଥା ଜରପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୩. ସପେଟାର ପତ୍ରଦାଗ:- ଏହି ରୋଗଦ୍ୱାରା ପତ୍ରରେ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ଧିରେଧିରେ ନାଲି ହୋଇ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ପାକଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଝଟି ପଡେ ଯାହାକି ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କମାଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିକାର: ମାସକୁ ୨ଥର ବାରିଷ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ବୁଲଟକୁ ୫୦ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ତଥା ଗଛ ମୂଳରେ ଛେଦି କରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ।

୪. ପଣସର ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ସହାରୋଗ:- ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଛୋଟ ବା ଅପରିପକ୍ୱ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଖସି ପଡ଼ିବା । ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ୨-୩ ଥର ତାଲଥେନ୍ ଏମ୍-୪୫ କିମ୍ବା ବୁଲ୍ବଟକ୍ ୫୦ କିମ୍ବା ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୫. ଲେମ୍ବୁରେ କ୍ୟାଙ୍କର ବା ଯାଦୁରା ରୋଗ:- ଏହା ଲେମ୍ବୁରେ ଦେଖା ଦେଖାଯାଏ । ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଦାଗ ପତ୍ରର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ ତଥା ପରେ ପାଣିଟିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଦୁରା ହୋଇଥାଏ । ରୋଗର ଚାତୁରୀ ଦେଖା ହେଲେ ଛୋଟ ତାଳ ଓ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ଦେଖାଯାଏ । ସଠିକ୍ ପୋଷଣ ତଥା ସଂକ୍ରମିତ ତାଳକୁ କାଟିବା ସହ ପତ୍ର ଖଣି ଜାତୀୟ ପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ଷ୍ଟେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ (୦.୫ଗ୍ରା/ଲି ପାଣି) ର ସିଞ୍ଚନ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

୬. ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ଭୂରାଣୁ :- ଏହି ରୋଗଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଆକାର ଛୋଟ ହୁଏ, ପତ୍ର ମୋଡ଼ିହୋଇଥାଏ ତଥା ପତ୍ରର ହରିତ୍ କଣା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ଧଳା ମାଛିଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ପତ୍ରଧାର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ତଳଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିହୋଇଯାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ଗଛ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିବା ଶକ୍ତି ହରାଇବସେ । ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତ୍ର ଝଟିଯାଏ ତଥା ଗଛର ବୃଦ୍ଧିର ଅବସାନ ଘଟିଥାଏ । ଧଳା ମାଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତଥା ସଂକ୍ରମିତ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ ।

୭. ଡାଉନିମିଲିଟି:- ଏହି ରୋଗ କାକୁଟି, ଚରଭୁଜ, ଜହ୍ନି, ଲାଉ ଓ କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଏ । ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଦାଗ ପତ୍ରର ଉପର ପଟ୍ ଓ ତଳପଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଦାଗ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ପରେ ଝାଉଁଳି ପତେ ପ୍ରତିକାର :- ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଲ୍ବଟକ୍ କିମ୍ବା ରିଡୋମିଲ ୨ ଗ୍ରା/ଲି ପାଣିରେ ୧୦-୧୨ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୮. ଚାଇଗଣ ଫୋମାସିସ୍ ବୁଲ୍ବଟ:- ଏହି ରୋଗ ଗଛର ବା ମୂଳର କାଣ୍ଡରେ ଘନ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ପତେ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଏ । ପତ୍ରରେ ପାଉଁଶିଆ ଗୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ପରୀକ୍ଷଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ହୋଇଥାଏ । ପରେ ପରେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସଡ଼ିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର:- ମଞ୍ଜିଶୋଧନ ପାଇଁ ଥାଇରାମ୍ ୨ ଗ୍ରା/କିଗ୍ରା ତଥା ତାଲଥେନ୍ ଏମ୍-୪୫ କିମ୍ବା ବୁଲ୍ବଟକ୍ ୫୦ କୁ ୨ ଗ୍ରା/ଲି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୨-୩ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୯. ଭୂରାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ :- ମୂଳା, କଲଗା, କାକୁଟି, ଚରଭୁଜ, କଶାଗୁ, ବିନ୍, ମଟର ଓ ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଉ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ମେଳାଇକ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଭେଣ୍ଡିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ କିସମ୍ ଯଥା- ଆକା ଅନାମିକା ଏବଂ ଆକାଅଭୟ ତଥା ନିରୋଗ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ରାସାୟନିକ ବିଷ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ସାବଧାନତା : (କ) ଫସଲ ବଗିଚାକୁ ନିୟମିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । (ଖ) ଆର୍ଥିକ ଦେହଳି ସାମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପରେ ଠିକ୍ ବିଷ, ଠିକ୍ ପରିମାଣ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । (ଗ) ରାସାୟନିକ ବିଷ ସକାଳ ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ବା ଉପରବେଳା ୪ଟା ପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସମ୍ପାଦନା :

ଡଃ. ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ଜୌଜନ୍ୟ : ଆମ୍ବା, ଅନୁଗୁଳ

ବିଷୟବସ୍ତୁ :

ଡଃ. ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଧାର

ଡଃ. ବିନାତା ଶତ୍ପଥୀ

ଶ୍ରୀ ତୀର୍ଥୀକ୍ କୁମାର ସାମନ୍ତ