

ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପିଆଜ ଚାଷ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନୁଗୁଳ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପିଆଜ ଚାଷ

ପିଆଜ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଓ ଏହାକୁ ଆମିଷ ଓ ନିରମିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ମସଲା, କଞ୍ଚା ସାଲଡ଼, ବାଟ ଶ୍ଵାସ, ଦାନ୍ତ, ଚନ୍ଦୁ ଓ ସୌରତାପ ଜନିତ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ୩୪୭୫୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଲାଙ୍ଗିର ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦୧୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପିଆଜ ଚାଷ କରାଯାଇ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୨.୧ ଟନ୍ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ସହିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ : ପିଆଜ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା, ଗରମ, ବର୍ଷା ବା ଖରା ପିଆଜ ଫସଲ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ । ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ଉତ୍ତାପରେ ପିଆଜରୁ ଶଷ୍ଟା ବାହରି ଆସେ । ତାପମାତ୍ରା ୫୦° ବଢ଼ିଗଲେ ପିଆଜ ଆକାର ସାନ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ପାକଳ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା : ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର, ଦୋରସା, ବାଲିଆ ଦୋରସା, ମଟାଳ ଓ ପଟୁମାଟି ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ । ଚିକିଟା, ଲୁଣି, କ୍ଷାରୀ, ଖାଲୁଆ ସତ୍ତ୍ୱସନ୍ନିଆ ଜମିରେ ପିଆଜ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ହାଲୁକା ମାଟିରେ ପିଆଜ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର କରେ ଓ ଶୀଘ୍ର ପାକଳ ହୋଇଯାଏ । ଭାରି ମାଟିରେ ପିଆଜର ଆକାର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ୫.୮ ରୁ ୬.୫ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଏହି ଚାଷକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯିବା ଦରକାର । ବର୍ଷାଦିନେ ଡ଼ିପ ଜମିରେ ଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଆଜ ଚାଷ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ।

କିସମ : ଓଲି ପିଆଜରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି । ଯଥା - ନାଲି, ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ । ନାଲି ଓ ଧଳା କିସମର ଚାହିଦା ଅଛି । ଧଳା କିସମ ଅପେକ୍ଷା ନାଲି କିସମର ରାଗ ଅଧିକ । ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିଥିବା ପିଆଜ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -

ନାଲି ଓଲିପିଆଜ-ଏଗ୍ରିଫାଉଣ୍ଡଲାଉଟ ରେଡ଼, ନାସିକ୍ରେଡ଼,

ପୁଷାରେଡ, ପୁଷାରତନାର, ଏଗ୍ରିଫାଉଣ୍ଡ ଡାର୍କରେଡ, ପଞ୍ଜାବ ସିଲେକସନ,
ଏନ-୫୩, ଏନ-୨-୪-୨, ଏନ୍ ୨୦୭-୧, ହିସାର-୨, ସି.୫-୨.

ଧଳା ଓଲିପିଆଜ - ପୁଷା ହ୍ୱାଇଟରାଉଣ୍ଡ, ପୁଷା ହ୍ୱାଟପ୍ଲୁଟ, ଧୂଳିଆ,
ଏନ୍. ୨୫୭-୯-୧, ଏନ୍-୧୨୩-୭-୧, ଉଦୟପୁର - ୧୦୨, ପାଟଣା
ହ୍ୱାଇଟ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଛୋଟ ପିଆଜ ବା ଦେଶୀ ପିଆଜ: ସି୫-୧, ସି୫-୨, ସି୫-୩,
ଆର୍କାବିନ୍ଦୁ, ଏମ୍.ଡି-ୟୁ-୧, ରମ୍ଭାଲୋକାଲ, ଜରିପଡା ଲୋକାଲ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଲଗାଇବା ସମୟ : ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନିଆ ପିଆଜ ନଭେମ୍ବରରୁ
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗାଯାଏ ଓ ଫେବୃୟାରୀରୁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ
କରାଯାଏ । ଖରିଫ୍ ପିଆଜ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ- ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇ
ଅକ୍ଟୋବର- ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଲମ୍ବ ଖରିଫ୍
ପିଆଜ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଜମିରେ ଲଗାଯାଏ ।

ବିହନ ପରିମାଣ : ଦେଶୀ ପିଆଜର କୋଲା ଓ ଓଲିପିଆଜର ମଞ୍ଜିରୁ ତଳି
କରି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଶୀତଦିନିଆ ଓଲିପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୮-୧୦
କି.ଗ୍ରା ଓ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ୧୨.୫ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହୁଏ । ଦେଶୀ
ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ୧୦୦୦-୧୨୦୦ କି.ଗ୍ରା. ପିଆଜ କୋଲା ହେକ୍ଟର ପିଛା
ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ
ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲେଇ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର ୧୫-୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ
ଚ୍ରାଇକୋଡର୍ମାଭିରିଡେ କବକ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମାଟିକୁ ଉପଚାରିତ କଲେ ମୂଳସତ୍ତା
ରୋଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଦ୍ଧତି : ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷାଦିନିଆ ପିଆଜ ପାଇଁ
ଜୁନ୍ ମାସରେ ଓ ଶୀତଦିନିଆ ପିଆଜ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତଳି
ପକାଯାଏ । ଏକ ହେକ୍ଟର ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ୫୦୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳି ଘେରା
ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତଳି ପଟିଗୁଡ଼ିକ ୩ ମିଟର ଲମ୍ବ, ୧ ମିଟର ଓସାର ଓ ୧୫
ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ଓ ଦୁଇ ପଟି ମଧ୍ୟରେ ୭୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ
ରଖାଯାଇଥାଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖତ ସାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାଟିରେ
ମିଶାଇ ମାଟିକୁ ଖୁସାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ । ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖିଲା ଖତ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଇ
ହାଲ୍‌କା ଭାବରେ ମାଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ୨ ଗ୍ରାମ
ବାଭିଷିନ ବା ଥିରାମ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତଳିଘେରାକୁ ଭିଜାଇ ଦିଆଯାଏ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରାକଟା ରୋଗ ତଳିଘେରାରେ ହୋଇନଥାଏ । ବର୍ଷାଦିନ ପିଆଜ ପାଇଁ
ତଳି ଘରା ଜରି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତଳି ପଟି ଯିବାର
ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଜମିକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚାଷ କରି ମାଟି ଗୁଣ୍ଠ କରାଯାଏ । ୨ ମିଟର ଓସାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳି କରି ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩୦ ଟନ ହିସାବରେ ଗୋବର ଖତ ଭଲ ଭାବେ ମାଟି ସହିତ ମିଶାଯାଏ । ରୋପଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୦୦ କି.ଗ୍ରା କ୍ୟାଲସିୟମଆମୋନିୟମନାଇଟ୍ରେଟ ଅଥବା ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ, ୩୦୦ କି.ଗ୍ରା. ସିଙ୍ଗଲସୁପରଫସଫେଟ ଓ ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରିଏଟଅଫପୋଟାସ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ ।

ଚାରା ରୋପଣ ପଦ୍ଧତି : ବର୍ଷା ଦିନରେ ୬-୩ ସପ୍ତାହ ଓ ଶୀତ ଦିନରେ ୮-୧୦ ସପ୍ତାହର ତଳି ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ତଳିଗୁଡ଼ିକ ୧୨-୧୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚା ହୋଇଗଲେ ଉପର ବେଳା ଉପାଡି ଲଗାଯାଏ । ଛୋଟ ତଳି ଲଗାଇଲେ ଜମିରେ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ରହେ ଓ ବଡ଼ ତଳି ଲଗାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଶିଷା ବାହରି ଆସେ ।

ଖରିଫ୍ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଉଚିତ ସମୟ ଅଟେ । ଲଗାଇବା ସମୟରେ ୧୫ ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଦରକାର । ସାଧାରଣତଃ ସମତୁଲ ପଟାଳିରେ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଡା ଟେକି ପିଆଜ ଚାରା ଲଗେଇବା ଭଲ । ଦେଶୀ ପିଆଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର କୋଲାଗୁଡ଼ିକ ଧାତିକୁ ଧାତି ୧୫ ସେ.ମି. ଓ କୋଲାକୁ କୋଲ ୮ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲଗେଇ ମାଟି ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଏ । କୋଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ ମାଟି ଉପରକୁ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ରୋଇବା ପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରାର ଟେରକୁ ୦.୨% ରିଡୋମିଲ ଦ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

ଫସଲର ଯତ୍ନ : ପିଆଜର ଟେର କମ୍ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ୧୫ ସେ.ମି. ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମାଟିର ଉପର ଭାଗ ହାଲକା ରହିବା ଦରକାର । ତଳି ଲଗେଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ମାଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନାବନା ଘାସକୁ ହାତରେ ଉପାଡି ଦିଆଯାଏ । ଘାସଗୁଡ଼ିକ ମାରିବା ପାଇଁ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଗଛ ରୋଇବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ବାସାଲିନ ୮୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଓ ଗଛ ଲଗେଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ କୋଡାଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ତଳି ରୋଇବାର ୩ ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩.୫ ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରା ବା ୨.୫ ଲିଟର ଲାସୋ ୮୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଶୀତ ଦିନିଆ ପିଆଜକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଅଧିକ ଶିଖା ବାହାରିଥାଏ । ରୋଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଶିଖା ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଶିଖା ବାହାରିଲେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କାଟି ଦିଆଯାଏ । ରୋଇବାର ୭୫ ଦିନ ପରେ ୬ ଗ୍ରାମ ମାଲିକ ହାଇଡ୍ରାଜାକଡ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶିଖା ବାହାରି ନଥାଏ ।

ସାର ଦେବାର ପରିମାଣ ଓ ସମୟ : ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ୬୦ କି.ଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ ୬୦ କି.ଗ୍ରା ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ସମୁଦାୟ ଫସଫରସ ଓ ଅଧା ପଟାସ ସାରକୁ ମୂଳସାର ରୂପେ ତଳି ରୋଇବାର ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ । ବଳକା ଥିବା ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅଧା ପଟାସ ସାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ତଳି ରୋଇବାର ୨୫-୩୦ ଦିନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟି ଖୁସାଯାଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଭାଗ କରି ତଳି ରୋଇବାର ୨୫-୩୦ ଦିନରେ ଥରେ ଓ ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଦେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ପାଣି ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । କିନ୍ତୁ ଯୁରିଆ ପାଣି ଦେବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଜଳ ସେଚନ : ତଳି ଲଗାଇବା ପରେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଆଜର ଚେର ଅଳ୍ପ ଗଭୀରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଫସଲ ଜଳର ଅଭାବ ସହିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି କମ୍ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଆଯାଏ । ଅଧିକ ପାଣି ମଡେଇଲେ ବା ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ପିଆଜ ସଢ଼ିଯାଏ ଓ ଭଲ ଅମଳ ମିଳେ ନାହିଁ । ଫସଲରେ ୧୫-୨୦ ଟି ଜଳସେଚନ ଦରକାର କରିଥାଏ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ୮-୧୦ ଥର ଓ ଶୀତ ଦିନରେ ୧୦-୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଖରାଦିନରେ ୬ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ୩ ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ମଡାଯାଏ । ଗଛ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓ ପିଆଜ ଫୁଲିବା ସମୟରେ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ (ଲଗେଇବାର ୬୦ ଦିନରୁ ୧୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଜଳସେଚନ କରିବା ଦରକାର । ପିଆଜ ଫୁଲିବା ସମୟରେ ପାଣି ମଡେଇବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫସଲରେ ଅଧିକ ପାଣି ମଡେଇଲେ ମୋଟା ବା ଲମ୍ବା ବେକ ପିଆଜ ଓ ଅନିୟମିତ ପାଣି ମଡେଇଲେ ଦୁଇ ଫାଳିଆ ପିଆଜର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା : ଉକୁଣିଆ ପୋକ ପିଆଜର ମୁଖ୍ୟ ପୋକ । ଏହା ଲାଗିଲେ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ନେବା ଫଳରେ ଗଛ ଶୁଖି ମରିଯାଏ । ଏହି ପୋକ ମାଟିରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାଟିକୁ ନିୟମିତ କୋଡାଖୁସା କରି ପାଣି ମଡେଇଲେ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରିଯାଏ । ଜମି ରୋଇବା ବେଳେ ଏକର ପିଛା ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନିମ

ପିଡ଼ିଆ ସହିତ ଲଗାଇବାର ୨୫ଦିନ ପରେ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ୧ମିଲି. ମାଲିଚର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ପିଆଜର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଲା ବାଦାମୀ କୂଟ ବା ପତ୍ରପୋଡ଼ା । ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗ ଗଛର ପତ୍ର ଆଗଆଡୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ସାଫ୍ ବା ୧ ଗ୍ରାମ ରିଡ଼ୋମିଲ୍ ଏମ୍ ଜେଡ୍ ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଡୋଫିଲଏମ ୪୫ ମିଶାଇ ୫୦ ଦିନ ପରେ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨-୩ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରାଗଲେ ଏହି ରୋଗର ନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ । ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଟିପଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଔଷଧ ପତ୍ରରେ ଲାଗିରହେ ଏବଂ ଭଲ କାମ ଦିଏ । ପିଆଜ ଖୋଳିବାର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅମଳ : ପିଆଜ କିସମ ଅନୁସାରେ ୧୧୦ ରୁ ୧୫୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । ପିଆଜ ଗଛର ୬୦-୭୦ ଭାଗ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ପିଆଜ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଖୋଳିବାର ୧୦-୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରି ୨.୫ ଗ୍ରାମ ମାଲିକହାଇଡ୍ରାଜାଇଡ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫସଲ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଅମଳ ପରେ ପିଆଜ ଗଜା ନ ହୋଇ ବେଶି ଦିନ ସାଇତି ରହପାରେ । ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ କଲେ ପିଆଜରେ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ବାହରିଯାଏ । ଶୁଷ୍କ ଖରାଟିଆ ଗରମ ପାଗ ଦେଖି ପିଆଜ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଅମଳ ପରେ ବେକ ଉପରୁ ୨.୫ ସେ.ମି. ରଖି ଅଗ ଓ ସମୁଦାୟ ଚେର କାଟି ଦିଆଯାଏ ।

ଉତ୍ପାଦନ : ଖରିଫ ଫସଲ ସମୟରେ ୨୦୦-୨୫୦ କିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ଏବଂ ରବି ଫସଲ ସମୟରେ ୩୦୦-୩୫୦ କିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

ବିଷୟବସ୍ତୁ :

ଡ଼. ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କର
ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଧୀର୍
ଶ୍ରୀ ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି
ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ସମ୍ପାଦନା :

ଡ଼. ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ସୌଜନ୍ୟ : ଆମ୍ବା. ଅନୁଗୁଳ