

ଲାଭଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗୁଣ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଲାଭଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଋଷ

ଡଃ ଅଜୟ ପ୍ରସାଦ କାନୁନଗୋ

ଡଃ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନୁଗୋଳ

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ତୈଳବାଜ ଫସଲ । ଏହା ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଝଷ କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଝଷ କରାଯାଉଥିବା ଜମିର ଆୟତନରେ ଭାରତ, ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ କିନ୍ତୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଝଷ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା - ଏହା କମ୍ ଦିନରେ (୮୫ରୁ ୧୦୦ ଦିନ) ଅମଳ ହୁଏ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହିପାରେ । ଏହା ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷସାରା ଝଷ କରାଯାଇପାରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲରୁ ଡାଲିଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏହାର ତେଲରେ ଥିବା ଶତକଡ଼ା ୬୫ ଭାଗ ଲିନୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ କୋଲେଷ୍ଟରଲ୍ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ହୃଦରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଏହି ତେଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଧାନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପିଡିଆରୁ ଉନ୍ନତ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଝଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନବ ବିହନ ଓ ତେଲର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବଜାରିକରଣର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହାର ଝଷ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ । ତେବେ କର୍ଷାତକ, ପଞ୍ଜୀକ ଓ ଆହୁପ୍ରଦେଶରେ ଏହାର ଝଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ :

ସାଧାରଣତଃ ନିଗିଡ଼ା ବାଲିଆ ବୋରସା ମାଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଝଷ ଭଲହୁଏ । ୬.୫ରୁ ୮.୫ ପି.ଏଚ୍. ଥିବା ମାଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଶାନ୍ୱରୁପ ଭାବରେ ଭଲ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତଳି ବା ଖରା ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଫୁଲଫଳ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଓ ଖରାପାଗ ଦରକାର କରେ; କିନ୍ତୁ ଗଜା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥଣ୍ଡାପାଗ ଦରକାର କରେ । ଅଧିକ ଆଦ୍ର ଏବଂ ମେଘୁଆ ପାଗ ବା ବର୍ଷା ମଂଜି ଗଠନରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଏ । ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରା ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ମଞ୍ଜି ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ । ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ହେଲେ ତେଲରେ ଲିନୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭାଗ କମିଯାଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷାଦିନେ ଜୁନ-ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଶିତଦିନେ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଜାନୁୟାରୀ-ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବୁଣିଲେ ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଶୀତଦିନେ ଟିକିଏ ଆଗୁଆ ବୁଣା କଲେ ଫସଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିରେ ଜଳାୟତ୍ତଶ ଜଳଦି ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ଫସଲଟି ମାଟିର ବତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ ।

ଜମିପ୍ରସ୍ତୁତି :

ମାଟିରେ ବତର ନଥିଲେ ପାଣି ମହାଲ ଜମି ପାର୍ଶିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଋଷ ଲୁହାଲଙ୍ଗଳରେ କଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋଷ ଦେଶୀ ଲଙ୍ଗଳରେ କଲେ ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଋଷ ପରେ ଆଉ ୩/୪ ଓଡ଼ ଋଷ ଦରକାର ପଡ଼େ । ଶେଷ ଓଡ଼ ଋଷ ସମୟରେ ଟଟନ୍ ଗୋବରଖତ କିମ୍ବା ୨.୫ ଟନ୍ ଜିଆଖତ ସମାନଭାବେ ବିଶୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଜିଆଖତକୁ ମଞ୍ଜିବୁଣା ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କମ୍ ପରିମାଣର ଜିଆଖତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସହ ଫସଲରେ ତାର ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ । ଶେଷଓଡ଼ ଋଷପରେ ମଇଦେଇ ମାଟିକୁ ଝପି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ବିହନ କିସମ :

ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି କିସମର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ କିସମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହାଲବୁଡ଼ କିସମ । ନିମ୍ନରେ କିସମ ଏବଂ ଅମଳ ସମୟ ଦିଆଗଲା ।

ଉନ୍ନତ କିସମ	ଅମଳ ସମୟ (ଦିନ)
ମଡ଼ର୍ଷ	
ସନରାଜଜ	୮୦ - ୯୦
ହାଲବୁଡ଼ କିସମ	
ପି.ଏ.ସି. ୩୬	୯୫
କେ.ବି.ଏସ୍.ଏଚ୍-୧	୯୦-୧୦୦
ଏ.ପି.ଏସ୍.ଏଚ୍-୧୧	୯୦-୧୦୦
ଏମ୍.ଏସ୍.ଏଫ୍.ଏଚ୍-୫	୯୦-୧୦୦
ଏମ୍.ଏସ୍.ଏଫ୍.ଏଚ୍-୧୭	୯୦-୧୦୦
ପି.ଏ.ସି.-୧୦୯୧	୯୦-୧୦୦

ମଡ଼ର୍ଷ ବା ସନରାଜଜ କମ୍ ଦିନରେ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଭାବରେ ଋଷ କରାଯାଇ ପାରିବ । ହାଲବୁଡ଼ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିମାନଙ୍କର ଋଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ବିହନ ପରିମାଣ ଓ ବିଶୋଧନ : ହେକ୍ଟରପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୦ କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ପ୍ରଥମେ ବିହନକୁ ପାଛୁଡ଼ି ସେଥିରେ ଥିବା ଫମ୍ପା ଓ ଅଗାଡ଼ି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ । ମଞ୍ଜିର ଚୋପା ଟାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଜା ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବୁଣିବାର ପୂର୍ବଦିନ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ୭/୮ ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ପରେ ରାତିସାରା ଖୋଲା ଚଟାଣରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବାଉଁଶିନ୍ ବା ୩ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ ବା ୫ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇକୋଡ଼ର୍ମା ଭିରିଡ଼େ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ : ମାଟିରେ ଅଧିକ ବତର ଥିଲେ ମଞ୍ଜି ଭଲଭାବରେ ଗଜା ହୁଏ । ତେଣୁ ମାଟିରେ ଅଳ୍ପତଃ ୨-୩ ଇଞ୍ଚ ବତର ଥିଲାବେଳେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଦରକାର । ମଜ ଦିଆଯାଇ ସମତୁଲ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୁଇ ଫୁଟ୍ (ହାଲବିଡ଼ କିସମ ପାଇଁ) କିମ୍ବା ୧.୫ ଫୁଟ୍ (କଂପୋଜିଟ୍ କିସମ ପାଇଁ) ଦୂରତାରେ ୨/୩ ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ସିଆର କାଟନ୍ତୁ । ସିଆରରେ ପ୍ରଥମେ ସାର ସମାନ ଭାବେ ବିଛୁଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୧ ଫୁଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨ଟି କରି ମଞ୍ଜି ପୋତନ୍ତୁ । ତାପରେ ମଜ ଦେଇ ମାଟି ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ । ଗଛହେବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ୧ ଫୁଟ୍ ଦୂରତାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ (କଂପୋଜିଟ୍) କିମ୍ବା ଦେଢ଼ ଫୁଟ୍ ଦୂରତାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ (ହାଲବିଡ଼) ରଖି ବାକିତକ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ହେକ୍ଟର ପିଛା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ରୁ ୭୫,୦୦୦ ରହିବା ଦରକାର । ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଫୁଲର ଆକାର ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ।

ସାର ପ୍ରୟୋଗ : ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲରେ ଭଲ ବାନ୍ତା ଧରିବା ପାଇଁ ବେଶି ପରିମାଣରେ ଫସ୍‌ଫରସ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗଛକୁ ସବୁଜ ଏବଂ ସତେଜ କରି ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଫମ୍ପା ବା ଅଗାଡ଼ି କରିଦିଏ । ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଉର୍ବରତା ଥିବା ମାଟିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୪୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କେ.ଜି. ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଓ ୨୦ କେ.ଜି. ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୧୬୦ କେ.ଜି. ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ୨୪୦ କେ.ଜି. ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପର ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଓ ୩୦ କେ.ଜି. ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଜଳସେଚିତ ଫସଲରେ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୫୦% ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ସବୁତକ ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ସାରକୁ ମିଶାଇ ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି ୫୦% ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଘାସ ବାଛି କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ୨୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ୨୦ କେ.ଜି. ଫସ୍‌ଫରସ୍ ମିଶାଇ ଏକାଥରକେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପର ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ସାରରେ ଥିବା ସଲଫେଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ତେଲ ଅମଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଗଛରେ କଢ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ଗ୍ରାମ୍ ବୋରନ୍ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମଞ୍ଜି ନିଦା ହୁଏ ।

କୋଡ଼ାଖୁସା ଓ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଲଗାଇବାର ୧୫ରୁ ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ରଖି ଅଧିକା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଏବଂ ଘାସବାଛି ଗଛ ମୂଳକୁ ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଉ ୬ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିଆରାରୁ ଘାସ ବାଛି କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଗଛମୂଳକୁ ପୁଣିଥରେ ମାଟି ଟେକିଦିଅନ୍ତୁ । ହୁଡ଼ା ଟେକିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଜଭୂତ ରୁହେ । ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଏବଂ ଓଜନଦାର ଫୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚା ହୁଡ଼ା ଦେବା ଦରକାର । ବଡ଼ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଲ କିସମ ଗଛରେ ବାଉଁଶ ଡେରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ।

ଘାସ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।
 ବିହନ ବୁଣିବାର ପୂର୍ବଦିନ କିମ୍ବା ଘାସ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ବତର ଥାଇ
 ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍‌କ୍ଲୋରାଲିନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କେ.ଜି. (ଏ.ଆଇ.) ୧୦୦୦
 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଜମିରେ ସମାନ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସହଜ ପ୍ରୟୋଗ
 ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪ କେ.ଜି. ସିର୍‌ମେଟ୍ ବାଲିରେ ମିଶାଇ ସମାନଭାବରେ ବିଞ୍ଚିଦିଅନ୍ତୁ ।
ଜଳସେଚନ : ଫୁଲ ଧରିବା ଏବଂ ଦାନା ବାଂଧୁବା ସମୟ ହେଉଛି ଫସଲର ସଂକଟ
 ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ଫସଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର । ନଚେତ୍ ମଞ୍ଜି
 ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ । ବର୍ଷାଦିନିଆ ଫସଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା
 ଦରକାର ପଡ଼େନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜଳ
 ସେଚନ ଦରକାର ପଡ଼େ । ବେଶି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ନିଷ୍ପାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ।
 ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖରେ ବୁଣିବାର ୩୦/୩୫ ଦିନ ପରେ ଗଡ଼ାଣିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ
 ୧୦ ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ନାଳି ତିଆରି କଲେ ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ ସୁଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଫସଲର
 ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ । ଶୀତ ଦିନିଆ ଫସଲରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଜଳ ସେଚନ
 ଦେଇ ଜମି ପାଗିବା ପରେ ଋଷ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ । ଗଜା ହେବାର ୨୫/୩୦ ଦିନ ପରେ
 ଅର୍ଥାତ୍ ୪-୫ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଓ ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ (୬୦-୬୫
 ଦିନର) ତୃତୀୟ ଥର ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଦରକାର । ପାଣି ସୁବିଧା ଥିଲେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବା
 ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଳ ସେଚନ ଦେଲେ ଅମଳ ଭଲ ହୁଏ ।

ଖରାଦିନିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପାଇଁ ୧୦/୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ
 ପ୍ରାୟ ୬-୭ଟି ଜଳସେଚନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ । ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ହାଲୁକା ଜଳ
 ସେଚନ କରିବା ବିଧେୟ କାରଣ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଉପର ବେଳାରେ
 ପବନ ବହୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଜଳ ସେଚନ କରିବା ଦରକାର ।

ଫମ୍ପା ମଞ୍ଜି ନ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଫମ୍ପା ମଞ୍ଜି ରହିଯାଏ କାରଣ ଏହା ସ୍ଵପରାଗଧର୍ମୀ
 ଫସଲ ନୁହେଁ । ଏହାର ପରାଗ ସଂଗମ ମହୁମାଛି ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିବାରୁ ଫସଲରେ ହେକ୍ଟର
 ପିଛା ୮/୧୦ଟି ମହୁମାଛି କଲୋନି ସହ ମହୁ ବାକ୍ସ ରଖିଲେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଅମଳ ହେବା ସହ
 ହେକ୍ଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨୦ କେ.ଜି. ମହୁ ଅମଳ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆୟ
 ବଢ଼େ । ଫୁଲ ଧରିବା ବେଳେ ଫୁଲ ଉପରେ ଧଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପୁରୁଷ କେଶର ସଂଗ୍ରହ
 କରି ପରଦିନ ସକାଳେ ଅନ୍ୟଫୁଲ ଉପରେ ଢାକିଲେ ଗଛ ପିଛା ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ଅମଳ
 ହୋଇପାରିବ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶତକଡ଼ା ୧୦/୧୫ ଭାଗ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ସଫାକନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସକାଳ ୮ ରୁ ୧୦
 ମଧ୍ୟରେ ଓ ଉପରବେଳା ୮ ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ୮/୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲର ଉପରି ଭାଗକୁ
 ଘସିବା ଦ୍ଵାରା ପରାଗ ସଂଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ସଂଖ୍ୟା ବେଶି ହୁଏ ।

ଯୋକ ଓ ରୋଗ ପରିଚ୍ଛଳନା :

(୧) **ଶୋଷକ ଯୋକ :** ଧଳାମାଛି, ଜଉଆ, ଡାହାଣୀ ଏ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ଓ କଢ଼ରୁ ରସ ଶୋଷିତ । କିଆରୀରେ ଅଧିକ ବତର ଥିଲେ ବା ଗଛ ବହଳ ଥିଲେ ଏ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ । ଡାହାଣୀର ଛୁଆ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋକ ରସ ଶୋଷିବା ସହ ଗଛକୁ ନିଜର ଲାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ କରନ୍ତି । ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଓ ଶିରା ଲାଲ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ଗଛରେ ପତ୍ରଟି ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଇ ଖସିପଡ଼େ । ଧଳା ମାଛି ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରୁଗଣ ଦିଶନ୍ତି ଓ ତା ଉପରେ କଳା ଫିମି ମାଡ଼ିଯାଏ । ଜଉଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଯିବାରୁ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।

(୨) **ପତ୍ରଶୁଆ ସଂବାଳୁଆ :** ଏ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟିଯୋକ ଓ ବିହାରି ସଂବାଳୁଆ ପ୍ରଧାନ । ଏ ଦୁଇଟିକର ‘ମା’ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜାପତି ଜାତୀୟ ଓ ଏମାନେ ପତ୍ର ତଳେ ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା କରି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଗାରୁ ୪ ଦିନ ପରେ ଛୁଆ ବାହାରି ପତ୍ରରୁ ସବୁଜ ଅଂଶ ତଳ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ଭଳି ଦିଶେ ।

(୩) **ମଞ୍ଜିଶୁଆ ହେଲିଓଥୁସ୍ ସର୍ବଭକ୍ଷ ଯୋକ :** ଏହାର ‘ମା’ଟି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଜାପତି ଓ ଏହା ଗଛର ଅଗି ଓ କଢ଼ ଉପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ । ସେଥିରୁ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ଭିତରେ ଅତି ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ବାହାରି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଫୁଲ ଓ କଢ଼ ଖାଇଯାନ୍ତି । ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକଙ୍କର ଦେହରେ ଅତି ସୁସ୍ଥଲୋମ ଓ ଦେହର ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟି ଗାର ଥାଏ । ଶୀତଦିନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଖରାଦିନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ପରେ ଗଛ ଫୁଲ ମାଟିରେ କୋଷା କରନ୍ତି ଓ ସେଠାରୁ ୫ରୁ ୮ ଦିନ (ଶୀତଦିନର ୮ରୁ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପରେ ପ୍ରଜାପତି ବାହାରି ପୁଣି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି । ବଡ଼ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଜିଖାଇ ବେଳେବେଳେ ଫୁଲକୁ ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଫୁଲରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ।

(୪) **ପକ୍ଷୀ :** ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ । ବିଶେଷତଃ ମଞ୍ଜି ପାକଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଦଳ ଦଳ ଶୁଆ କିଆରୀରେ ବସି ଗଛରୁ ପୁରା ମଞ୍ଜି ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି । ଦାନା ପୁରଣ ଠାରୁ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସଂଧ୍ୟାରେ ଫସଲ ଜଗାରଖା କରିବା ଦରକାର । ସେଇ ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଳ ଫୋଟକା ବାଣ ଫୁଟାଏ କିମ୍ବା ଫମ୍ପା ବନ୍ଧୁକ ଶବ୍ଦ କରି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଘରଢ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଫସଲ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଫୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିବନ୍ (ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରୁଥିବା) ପ୍ରତି ୧୫ ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ (ଉଇରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ-ଯେଉଁଳି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ) ଏହା ଦ୍ଵାରା ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଉ କିଆରିରେ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ରୋଗ :

(୧) ଅଲଟର ନାରିଆ ବ୍ଲାଜର୍ - ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ ଫସଲର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ଷତି କାରକ ରୋଗ । ଏହାସବୁ କିଷମରେ ଶୀତଦିନେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମାଡ଼ିଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଳାକଳା ଦାଗ ପଡ଼େ, ଫୁଲ ଓ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ନରମ କାଣ୍ଡ ଓ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ପରେ ମରିଯାଏ । ଜଳାୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ରହିଲେ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯାଇ ଫୁଲକୁ ସଜାଇ ଦିଏ । ବେଳେ ବେଳେ ମଞ୍ଜିର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହାସ ପାଏ ।

ପ୍ରତିକାର : (୧) ରୋଗ ସହଣୀକ କିଷମ ବି.ଏସ୍.ଏଚ୍-୧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

(୨) ମଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧାର ୩୫ ଦିନ ପରେ, ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ବା ୩ଥର ଟ୍ରିଥେନ୍ ଏମ୍ ୪୫ (୩ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିପ୍ରତି) ବା ବାଉଷିନ୍ (୧ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ।

(୨) ଜଳଜି ରୋଗ (Rust) : ଏହା ଶୀତ ଦିନିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ ଫସଲରେ ବେଶୀ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଫସଲରେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦେଲେ ଫସଲର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଓ ଅମଳ ଖୁବ୍ କମିଯାଏ ।

ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ସବୁ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଉପରେ ଦେଖାଦିଏ ଓ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡ଼ି ଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ଫସଲର ମଞ୍ଜିରୁ ଉଠିଥିବା ଗଛରେ ଏହି ରୋଗର ମୂଳ ରହିଥାଏ ଓ ଋତୁଆଡ଼େ ପବନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର : (୧) ରୋଗ ସହଣୀକ କିଷମ ବି.ଏସ୍.ଏଚ୍-୧ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

(୨) ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

(୩) ଫସଲ କାଟି ସାରି ଜମି ତୁରନ୍ତ ହଳକରି ପୁରୁଣା ଫସଲର ଅବଶେଷାଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ ଫସଲର ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ଓ ଯୋକ ପରିଚ୍ଛଳାନା :

ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ ଫସଲକୁ କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇବା ପରେ ନିରନ୍ତର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ବା ଯୋକର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦୋହଳ ସାମାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଯୋକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂବାଲୁଆ ଓ ପତ୍ରକଟା ଯୋକ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୩୦ରୁ ୪୦ ଭାଗ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ପତ୍ରକଟା ଯୋକ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୯୦ରୁ ୧୦୦ ଭାଗ ଗଛ ମାରିଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ହେଲିଓଥ୍ସ ମଞ୍ଜିଖୁଆ ଯୋକ ଶତକଡ଼ା ୨୦ରୁ ୩୦ ଭାଗ ଅମଳ କମାଇ ଥାଆନ୍ତି । ନିମ୍ବମୂଖୀ ଫିମିରୋଗ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଫସଲରେ ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆକରି ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୂତାଣୁ ରୋଗ (ନେକ୍ରେସିସ) ଯୋଗୁ ଫସଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଫସଲରେ ରୋଗଯୋକ କମାଯାଇ ପାରିବ ।

- ୧) ଖରାଦିନେ ଉଦ୍‌ବିଷ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ ଋଷ କରିଲେ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ରୋଗ ଓ ଯୋକ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ।
- ୨) ପତ୍ରକଟା ଯୋକର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କିଆରୀରେ ବୁଡ଼ାଜଳ ସେତନ ଦେଇ ପରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯାଏ ।
- ୩) ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନାବନା ଗଛ କିଆରୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ଯୋକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
- ୪) ମଞ୍ଜିକୁ କିଆରୀରେ ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି ୫ ଗ୍ରାମ ଗାଉଁର (ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଜ୍‌ର ଗୁଣ୍ଡ) ମିଶାଇ ପକାଇଲେ ପରେ ଫସଲରେ ଶୋଷକ ଯୋକ ଯଥା ଜଡ଼ାଆ, ଧଳାମାଛି, ଉକୁଣା ଡାଆଣା ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।
- ୫) ଫଳସଜ୍ଜା, ଫିମି ଜନିତ ନିମ୍ନମୁଖୀ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ମଞ୍ଜିକୁ ମେଟାଲାଇଲ୍ ଗୁଣ୍ଡ କି.ଗ୍ରା ପ୍ରତି ୬ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ ପକାଇବା ଦରକାର । ଫସଲରେ କ୍ଲାଇଟକ୍ ୫୦ ଫିମି ନାଶକ ଔଷଧ ଲିଟରରେ ପାଣିରେ ୩ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୬) ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଫସଲରେ ଦୁଇଧାଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଗେଡ଼ା ସହକ କିସମ ହରଡ଼ ଲଗାଇଲେ ପତ୍ରଖୁଆ ଯୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯାଇଥାଏ ।
- ୭) ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଯଦି ପତ୍ରଖୁଆ ଯୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୋଷ ଦେଖନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଘୋଡ଼ାଯୋକ, ହେଲିଓଥ୍‌ସ୍ ଓ ସଂବାଲୁଆ ଦମନ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାରୀ ।
- ୮) ପତ୍ରଖୁଆ ଯୋକଙ୍କର ଦମନ ପାଇଁ ନିମ୍ନମଞ୍ଜିର ଶତକଡ଼ା ୫ ଭାଗ ପାତନ ପତ୍ର ଉପରେ ସର୍ପି ସହ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମା ତଳେ ରହିଥାଏ ।
- ୯) ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଋଷ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଭଲଟିସିଲିଅମ୍ ଝାଉଁଳାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁତ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡ଼ର୍ମା ଭିରିଡ଼େ ବା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍‌ମ୍‌ର ପାଉଡ଼ର୍ ମିଶାଇ ବୁଣିବା ଦରକାର । ମାଟିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଖତ ସହ ୧୨ କି.ଗ୍ରା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୧୦) ହେଲିଓଥ୍‌ସ୍ ମଞ୍ଜିଖୁଆ ଯୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ସଂଗ ଆକର୍ଷକ ଜଞ୍ଜା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ଏଣ୍ଟୋସଲଫାନ୍ (ଲିଟର ପ୍ରତି ୩ ମି.ଲି.) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ୧୧) ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପତ୍ରଖୁଆ ଯୋକ ଦମନ ପାଇଁ ମେଟାସିଷ୍‌କସ୍ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ବା କନଫିଡ଼ର୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି. ଗୋଳାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ରୋଗ :

ଗଳାସଜା : ବୁଣିବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ରୋଗିଣୀ ପରି ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ । ଗଛ ଫୁଲରେ ସୋରିଷ ଆକୃତିର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫିମି ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଛଟି ମରିଯାଏ ।

ନିମ୍ନୋମ୍ବୁଖୀ ଫିମି ରୋଗ : ତଳିଘରାରେ ଫୁଲସଜ୍ଜିଯିବା, ପତ୍ରରେ ଛାପ ପରି ଦାଗ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ସହ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଧୁତ କମିଯାଏ । ଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଞ୍ଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିପାରେ ନାହିଁ । ଫୁଲରେ ମାଞ୍ଜି ପାକଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପରକୁ ସିଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ସାହେବୀ ଓ ପରୁରୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ପ୍ରଧାନ ରୋଗ । ଭୂତାଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଞ୍ଜି ବା ଧଳାମାଛି ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ । ପ୍ରଥମଟିରେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟଟିରେ ଫୁଲର ଫୁଲ ସଜ୍ଜିଯାଏ ଫଳରେ ଅମଳ ବନ୍ଧୁତ କମିଯାଏ ।

ଫସଲକଟା ଓ ଅମଳ :

ଗଛରୁ ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲେ ବା ଝଡ଼ିଗଲେ ଫୁଲ ମଞ୍ଜିରେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଭାଗ ଜଳାୟ ଅଂଶ ରୁହେ । ସେହି ସମୟରେ ଗଛ ଅଗରୁ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଆଣି ଖଳାରେ ୪-୫ ଦିନ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫୁଲମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଳା କରି ମଞ୍ଜି ଅମଳ କରାଯାଏ । ତାପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଜଳାୟ ଅଂଶ ଶତକଡ଼ା ୧୦ ଭାଗରୁ କମ୍ ହେଲା ପରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ।

ଅମଳ : ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨୦ କ୍ୟୁଷାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଅନ୍ୟଥା ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୧୦ କ୍ୟୁଷାଲ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ କ୍ୟୁଷାଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଓ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ :

ଦୁଇଧାଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସହ ୬ ଧାଡ଼ି ଚିନାବାଦାମ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଳ୍ପ ଦିନିଆ ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କିସମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଦିନିଆ ଏବଂ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ହରଡ଼ କିସମ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଭାବେ ଝିଅ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଝିଅ କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ ଏବଂ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ ୨-୩ ବର୍ଷିଆ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ନେଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ଏବଂ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯାଏ ।

ଧାନ ଅମଳ ହେବା ପରେ ପରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିବା ଜମିରେ ମାଟିର ଲବ୍ଧ ବତରରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲ ଝିଅ କରାଯାଇପାରେ । କେବଳ ଫୁଲ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ଭଲ । ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଆଳୁ ଅମଳ ପରେ ପରେ ମାଟିରେ ବଳିଥିବା ସାରକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସଫଳତାର ସହିତ ଝିଅ କରାଯାଇ ପାରିବ ।



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ

ପୋ : ହୁଲୁରାସିଂହା, ପଞ୍ଚମହଲା, ଅନୁଗୁଳ-୭୫୯୧୩୨